

ワクチン接種後の副反応について

(鶴岡キャンパス学生用)

- ・ ワクチン接種後、当日か翌日に、接種部位の疼痛や発熱、頭痛、倦怠感、腕が上がらない、関節痛等の症状が現れますが、通常2～3日以内で消失します。慌てずに対応しましょう。
- ・ 37.5 度以上の発熱や頭痛、接種部位の痛みが耐えがたい場合は、ためらわずに普段服用している鎮痛解熱剤（アセトアミノフェン、バファリン、ロキソニン等）を内服してください。
- ・ しかし、内服しても、解熱がなく 38℃以上の発熱が持続したり、接種部位の痛みが耐え難い、更に他の症状（気分不快、著しい倦怠感、動悸、息切れ等）が並存したりするような場合は、以下に連絡してください。

平日（8:30～17:00）※8月13日（金）、16日（月）、17日（火）は休業日

鶴岡キャンパス保健室 **0235-28-2817**

学務課学務担当 **0235-28-2808**

※応答がない・緊急を要する場合は、躊躇なく救急外来か近医を受診してください。

休日・時間外

山形県ワクチンコールセンター **0120-567-690**

※受付時間：午前8時30分から午後6時まで（土日祝日を含む）

24時間健康・医療相談サービス **0120-023-660**